

クルマヒラマキガイ

Hippeutis (Segnitilia) cantori
(Benson)

ヒラマキガイ科
Planorbidae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 II
水産庁 希少種

選定理由 | 西日本に分布域をもつが生息地は少なく、本県でも生息地は局限される。圃場整備や水田の干出による乾燥化などで、個体数が減少傾向にある

県内分布 | 大分市，野津町

分布域 | 本州(大阪・兵庫・山口) 九州(福岡・長崎・熊本・大分・宮崎) 沖縄
中国 ,ウツリヨウ島

生息環境 | イネの切り株や水路の周辺，休耕田。

現 状 | 水田や周辺の水路の乾燥化などで，生息環境が悪化して個体数が減少している。

チョウセンスナガイ

Gastrocopta (Sinalbinula) coreana
Pilsbry

スナガイ科
Chondrinidae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 掲載なし

選定理由 | 全国的に分布地は少なく，九州では本匠村の石灰岩地域にのみ生息する。樹木の伐採や造林による環境の変化で絶滅の危機に瀕している。

県内分布 | 本匠村

分布域 | 本州(埼玉・群馬・広島) 九州(大分)
韓国南部

生息環境 | 石灰岩地の凹地や礫の間，落ち葉の下。

現 状 | 一生息地では植林された樹木の生長に伴い，環境が変化したために生息の確認が出来なくなっている。

ホソキセルガイモドキ

Mirus rugulosus
(Moellendorff)

キセルガイモドキ科
Enidae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 準

選定理由 | 九州に広く分布域をもつが，本県では生息地が少ない。樹木の伐採により環境の悪化が懸念される。

県内分布 | 中津江村，弥生町

分布域 | 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)

生息環境 | 自然林内にある老木の樹幹。

現 状 | 古い樹木の樹幹に着生していたが個体数が減少して，最近では生息の確認が出来なくなっている。