

## ピントノミギセルガイ

*Hemizaptyx pinto* (Pilsbry)

キセルガイ科  
Clausiliidae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (臼杵市)

分布域 四国(徳島) 九州(大分) 沖縄

生息環境 神社の裏にある石垣の間や落ち葉の下。

現 状 山麓の崩落防止工事のために生息地が失われ、1995年以降生息の確認ができていない。

## トサギセルガイ

*Placeophaedusa tosana tosana*  
(Pilsbry)

キセルガイ科  
Clausiliidae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 四国に広く分布域をもつが、本県には生息地が少ない。自然林の減少により生息地、個体数ともに減少傾向にある。

県内分布 安岐町、竹田市、宇目町

分布域 本州(中部) 四国 九州(熊本・大分・宮崎)

生息環境 山地の自然林内で落ち葉の下や朽ち木。

現 状 樹木の伐採や造林のために、一部の生息地が失われている。

## アラナミギセルガイ

*Tyrannophaedusa (Tyrannophaedusa) oxycyma*  
(Pilsbry)

キセルガイ科  
Clausiliidae

### カテゴリー

大分県 IA  
環境庁 掲載なし

選定理由 九州南部が分布域で、本県では生息地が局限される。自然林の中に生息するが、登山者などの踏圧により絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 庄内町

分布域 九州(熊本・大分・宮崎・鹿児島)

生息環境 林内に堆積する落ち葉の下や朽ち木。

現 状 観光客や登山者の林内への立入りで、生息環境が徐々に悪化している。

備 考 本種は北限分布。