

ピルスブリギセルガイ

Tyrannophaedusa (Decolliphaedusa) pilsbryana
(Ancey)

キセルガイ科
Clausiliidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 九州北部が分布域で、本県でも主に北部に分布する。自然林の減少で、生息地が徐々に少なくなっている。

県内分布 山国町，耶馬溪町，本耶馬溪町，日田市，中津江村，上津江村，九重町，庄内町，大分市，宇目町

分布域 本州(山口) 九州(福岡・長崎・熊本・大分)

生息環境 丘陵地や低山地の森林内で倒木や朽ち木。

現 状 樹木の伐採による自然林の減少により，良好な生息地が少なくなっている。

カワモトギセルガイ

Tyrannophaedusa (Decolliphaedusa) kawamotoi
Kuroda & Taki

キセルガイ科
Clausiliidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 II

選定理由 本州の西部と九州の中部に分布域をもつ。本県では南部に分布する。樹木の伐採による環境の変化で個体数は減少傾向にある。

県内分布 三重町，野津町，津久見市，本匠村，佐伯市，宇目町，緒方町

分布域 本州(山口) 九州(熊本・大分・宮崎)

生息環境 石灰岩地や山地の林内で落ち葉の下や倒木の下。

現 状 生息地の石灰岩地が荒廃したために，その地区では生息の確認ができなくなっている。

ミヤザキギセルガイ

Tyrannophaedusa (Decolliphaedusa) miyazakii
Minato & Tada

キセルガイ科
Clausiliidae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 II

選定理由 大分県と宮崎県に分布域をもつ。本県では南部に分布するが，生息地は局限される。開発により生息環境の悪化が懸念される。

県内分布 上浦町

分布域 九州(大分・宮崎)

生息環境 石灰岩地のがれ場で礫の間や落ち葉の下。

現 状 生息地の近くでシイタケが栽培され始め，生息地の一部にも人為が及んでいる。