

ハガクレカナワラビ

Arachniodes yasui-inouei Kurata

オシダ科
Dryopteridaceae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (耶馬溪地区)

分布域 本州(紀伊半島・山口), 四国, 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境

現 状 「耶馬溪地区」で1981年に採集された標本はあるが、それ以降の生育状態は確認されていない。

備 考 日本固有種。

ツクシオオクジャク

Dryopteris handeliana C.Chr.

オシダ科
Dryopteridaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 掲載なし

選定理由 九州と中国・四国地方の一部に希に分布する。本県の生育地では森林伐採や林道工事などで個体数が減少し、絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 耶馬溪地区, (津江山地)

分布域 本州(山口), 四国(愛媛・高知), 九州(福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
中国

生育環境 低山地の林内。

現 状 「津江山地」では近年、生育が確認されていない。「耶馬溪地区」のものは、沢沿いのケヤキ林、スギ植林内に数個体が生育しているだけである。

ワカナシダ

Dryopteris pycnopteroides
(Christ) C.Chr.

オシダ科
Dryopteridaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 掲載なし

選定理由 群馬県から九州まで分布域をもつが、個体数は少ない。本県の生育地では森林伐採や道路工事などにより個体数が激減し、絶滅の危機に瀕している。

県内分布 玖珠丘陵地・山地, 別府湾沿岸域, 大分川・大野川丘陵地

分布域 本州(群馬県以西), 四国, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
中国(浙江省)

生育環境 丘陵地の林内。

現 状 伐採により個体数が激減し、消滅寸前の状態である。