

**キヨズミオオクジャク***Dryopteris namegatae*  
(Kurata) Kurataオシダ科  
Dryopteridaceae**カテゴリー**大分県 IB  
環境庁 掲載なし**選定理由** 関東地方以西にやや希に分布する。本県の生育地では森林伐採や道路工事などで生育環境が悪化しており、絶滅の危険性が高くなっている。**県内分布** 耶馬溪地区**分布域** 本州(関東地方以西), 四国, 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
中国(四川省)**生育環境** 丘陵地の林内。**現 状** 道路沿いに生育しており、生育環境も悪く、個体数も極めて少ない。**タニヘゴ***Dryopteris tokyoensis*  
(Matsum. ex Makino) C.Chr.オシダ科  
Dryopteridaceae**カテゴリー**大分県 準  
環境庁 掲載なし**選定理由** 温帯性のシダ植物で、四国や九州での分布域は限られている。本県では土地造成や道路工事、湿地の遷移進行などにより、生育地の減少が懸念される。**県内分布** 耶馬溪地区、津江山地、玖珠丘陵地・山地、九重火山群、由布・鶴見火山群**分布域** 北海道, 本州, 四国, 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
朝鮮半島・中国**生育環境** 丘陵地や低山地の湿地や湿った林内。**現 状** 生育地の周辺で観光地開発が進んでおり、個体数が減少している。**サクライカグマ***Dryopteris gymnophylla*  
(Bak.) C.Chr.オシダ科  
Dryopteridaceae**カテゴリー**大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし**選定理由****県内分布** (大分川・大野川丘陵地)**分布域** 本州(宮城県以南), 九州(大分)  
朝鮮半島, 中国, タイ北部**生育環境** 低地林内の斜面。**現 状** 1976年と1978年に採集された標本はあるが、それ以降の生育状態は把握できていない。**備 考** 九州では本県だけで生育が確認されていた。