

ニセヨゴレイタチシダ

Dryopteris hadanoi Kurata

オシダ科
Dryopteridaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 II

選定理由 中国・四国地方の一部と九州に希に分布する。シイ・カシなどの常緑樹林との結び付きが強いため、森林伐採や土地開発などの影響を受けやすく、生育地の減少が懸念される。

県内分布 別府湾沿岸域, 大分川・大野川丘陵域, 豊後水道域, 豊後水道後背地域, 北川上流域

分布域 本州(山口), 四国(高知), 九州(長崎・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 低地のやや乾燥した常緑樹林内や林縁。

現 状 生育地の多くが沿海地の人類文化地やその周辺部で、個体数は多くない。

備 考 1953年に宮崎県北浦町で採集されたものがタイプ標本。日本固有種。

ギフベニシダ

Dryopteris kinkiensis

Koidz. ex Tagawa

オシダ科
Dryopteridaceae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (玖珠丘陵地・山地)

分布域 本州(東北地方南部以南), 四国, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島, 中国

生育環境 丘陵地の路傍。

現 状 本県では1977年に「玖珠丘陵地・山地」で採集された標本はあるが、それ以降の生育状態は確認されていない。

ナチクジャク

Dryopteris decipiens

(Hook.) O.Ktze.

オシダ科
Dryopteridaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 暖地性のシダ植物で、関東地方以西に分布する。本県では沿海地から丘陵地に希に分布しているが、森林伐採や林道工事などによる生育環境の悪化が懸念される。

県内分布 大分川・大野川丘陵地, 豊後水道域, 豊後水道後背域, 大野川上流域, 北川上流域

分布域 本州(関東地方以西), 四国, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
中国

生育環境 沿海地から丘陵地の照葉樹林の林床や崖地。

現 状 森林伐採, 林道工事などで個体数が減少している。