

ハコネシケチシダ*Cornopteris christenseniana*
(Koidz.) Tagawaイワデンダ科
Woodsiaceae**カテゴリー**大分県 IB
環境庁 掲載なし**選定理由** 北海道を除く全国に分布しているが、分布量は少ない。本県での分布はごく希で、森林伐採や林道工事などにより、絶滅の危険性が高くなっている。**県内分布** 英彦山・犬ヶ岳山地，北川上流域**分布域** 本州, 四国, 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎)
韓国濟州島**生育環境** 低山地の湿った林内。**現 状** 生育地では生育範囲が極めて狭く、個体数も少ない。**オオヒメワラビモドキ***Deparia unifurcata* (Bak.) M.Katoイワデンダ科
Woodsiaceae**カテゴリー**大分県 準
環境庁 掲載なし**選定理由** 全国的に分布域が限られており、本県でも生育地は少ない。溪流沿いや崖地下部の多湿地に群生し、道路工事や護岸工事、遊歩道整備などによる生育環境の悪化が懸念される。**県内分布** 耶馬溪地区，日田低地・丘陵地，津江山地，玖珠丘陵地・山地**分布域** 本州(北陸・関東地方以南), 四国, 九州(福岡・熊本・大分・宮崎)
台湾, 中国南西部, インドシナ**生育環境** 丘陵地や低山地の林内や林縁，崖地の多湿地。**現 状** 県内の生育地では通常群生するが、個体数が激減した所もある。**ミドリワラビ***Deparia viridifrons* (Makino) M.Katoイワデンダ科
Woodsiaceae**カテゴリー**大分県 IA
環境庁 掲載なし**選定理由** 本州から九州まで広く分布するが、分布量は少ない。本県での分布はごく希で、生育地では森林伐採が進んでおり、絶滅の危険性が極めて高い。**県内分布** 玖珠丘陵地・山地，九重火山群，豊後水道後背地域**分布域** 本州(東北地方以南), 四国, 九州(福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島, 中国中部**生育環境** 低地から低山地の林内。**現 状** 生育地はいずれもスギ植林内で、個体数もごくわずかである。