

コウライイヌワラビ

Deparia coreana (Christ) M.Kato

イワデンダ科
Woodsiaceae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 IB

選定理由

県内分布 (中津・宇佐低地)

分布域 本州(東北地方・静岡),九州(大分)
朝鮮半島,中国東北部,ロシア東部

生育環境

現 状 過去に「中津・宇佐低地」で採集された文献記録があるが、その生育地は把握できていない。

ヒトツバシケシダ

Deparia lobatocrenata
(Tagawa) M.Kato

イワデンダ科
Woodsiaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 掲載なし

選定理由 関東地方以西に希に分布する。本県でもごく希に分布し、森林伐採や風水害などによる生育環境の悪化で、絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 耶馬溪地区

分布域 本州(関東地方以西),四国(高知),九州(福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 丘陵地のやや日当たりのよい林内。

現 状 生育地は少なく、個体数もごくわずかである。

備 考 日本固有種。

フモトシケシダ

Deparia pseudoconilii
(Serizawa) Serizawa

イワデンダ科
Woodsiaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 日本固有種で、東北地方以南にやや希に分布する。本県での分布域は限られており、道路工事や土地造成などによる生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 耶馬溪地区、玖珠丘陵地・山地、九重火山群、由布・鶴見火山群

分布域 本州(東北地方以南),四国(徳島),九州(福岡・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 丘陵地のやや日当たりのよい林内や林縁、路肩。

現 状 「九重火山群」の生育地では観光地化が進行し、個体数が減少している。その他の地域での分布はごく希で、個体数も非常に少ない。