

**オニヒカゲワラビ***Diplazium nipponicum* Tagawaイワデングダ科  
Woodsiaceae**カテゴリー**大分県  
環境庁 掲載なし**選定理由** 北海道を除く全国に広い分布域をもつが、本県での分布は希である。森林伐採や林道工事などによる生育地の減少や消滅が懸念される。**県内分布** 中津・宇佐低地，玖珠丘陵地・山地，別府湾沿岸域，豊後水道後背地域**分布域** 本州, 四国, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
中国**生育環境** 低地から丘陵地の林内。**現 状** いずれの生育地でも，1～数個体が生育しているだけである。**イワヤシダ***Diplazium cavalerianum*  
(Christ) M.Katoイワデングダ科  
Woodsiaceae**カテゴリー**大分県 IB  
環境庁 掲載なし**選定理由** 東北地方以南から九州にかけて広く分布するが，個体数は多くない。本県での分布も希で，森林伐採や遷移の進行，風水害などにより消滅した生育地があり，絶滅の危険性が高くなっている。**県内分布** 耶馬溪地区，玖珠丘陵地・山地，豊後水道後背地域，北川上流域**分布域** 本州, 四国, 九州(福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
中国**生育環境** 丘陵地から低山地の林内多湿地。**現 状** 生育が確認できるのは数か所だけで，個体数もごくわずかである。**コウラボシ***Lepisorus uchiyamae*  
(Makino) H.Itoウラボシ科  
Polypodiaceae**カテゴリー**大分県 II  
環境庁 掲載なし**選定理由** 暖地性のシダ植物で，伊豆半島以西の沿海地に分布するが，個体数は多くない。本県では「豊後水道域」の海岸近くに希に分布する。海岸の護岸工事や道路工事，遷移進行などによる生育地の減少が懸念される。**県内分布** (別府湾沿岸域)，豊後水道域**分布域** 本州(伊豆半島以西), 四国, 九州(福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島),  
沖縄**生育環境** 海岸や沿海地の岩上や石垣に着生。希に地上に生じる。**現 状** ほとんどの生育地でごく少数の個体が見られるだけである。「別府湾沿岸域」の生育地では，近年その生育状態は把握できていない。**備 考** 日本固有種。