

ヒメサジラン

Loxogramme grammitoides
(Bak.) C.Chr.

ウラボシ科
Polypodiaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 北海道から九州にかけて広く分布するが、生育地は少ない。本県でも希に分布し、道路工事による岩面の掘削、自然林の伐採などにより、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 耶馬溪地区、英彦山・犬ヶ岳山地、日田低地・丘陵地、津江山地、九重火山群

分布域 北海道,本州,四国,九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島,台湾,中国

生育環境 丘陵地や低山地の湿った岩上や樹幹にコケと混生。

現 状 県内数が所で確認されているが、いずれの生育地でも個体数は減少傾向にある。

オシャグジテンダ

Polypodium fauriei Christ

ウラボシ科
Polypodiaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 温帯性のシダ植物で、九州での分布は夏緑樹林内に限られている。本県ではごく希に分布し、自然林の伐採や生育環境の悪化などで生育範囲が狭くなり、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 英彦山・犬ヶ岳山地、津江山地、九重火山群

分布域 北海道,本州,四国,九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
韓国濟州島,南千島

生育環境 山地林内の樹幹に着生。

現 状 森林伐採や風水害による倒木被害などで、個体数が減少している。

オオクボシダ

Xiphopteris okuboi (Yatabe) Copel.

ヒメウラボシ科
Grammitidaceae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (津江山地)

分布域 本州(東北地方以西),四国,九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
台湾

生育環境 山地の樹幹や岩上に着生。

現 状 1930年に「津江山地」で採集された文献記録があるが、その生育地は把握できていない。