

## ネズ

*Juniperus rigida*  
Sieb. et Zucc.

ヒノキ科  
Cupressaceae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 県内では主として北部・西部地域の岩場に群生している。しばしば二次林に混生し、その伐採により、減少や衰退が懸念される。

県内分布 耶馬溪・国東丘陵地、中津・宇佐低地、日田低地・丘陵地、祖母・傾山地、北川上流域

分布域 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎)  
朝鮮半島 中国(東北部) 中国(北部)

生育環境 丘陵地や低山地の乾燥したやせ尾根の岩場。

現 状 北部地域の凝灰岩地には、しばしば群生地がみられる。

## ミクリ

*Sparganium erectum* L.  
subsp. *stoloniferum* (Ham. ex Graebn.) Hara

ミクリ科  
Sparganiaceae

### カテゴリー

大分県 II  
環境庁 準

選定理由 県内の生育地は点在して少ない。群生しているが、生育範囲は狭い。水質汚染や水生植物との競合で生育状態が悪化し、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 中津・宇佐低地、豊後水道後背地域

分布域 北海道 本州 四国 九州(長崎・熊本・大分・宮崎)  
朝鮮半島 中国(東北部) 中国,トルキスタン,アフガニスタン

生育環境 低地の池沼や水溝。

現 状 水環境が悪化して、生育状態の衰退した所がある。

## ヤマトミクリ

*Sparganium fallax* Graebn.

ミクリ科  
Sparganiaceae

### カテゴリー

大分県 II  
環境庁 II

選定理由 分布域は狭く、本県の生育地は点在し、群生しているが生育範囲は狭い。生育地の改修や水質汚染による生育環境の悪化で、生育地の減少が懸念される。

県内分布 中津・宇佐低地、玖珠丘陵地・山地、別府湾沿岸域

分布域 本州(関東地方以西) 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
インド,ビルマ

生育環境 低地や丘陵地の池沼、河川。

現 状 水環境が悪化して、生育状態の衰退した所がある。