

ケタガネソウ*Carex ciliato-marginata*
Nakaiカヤツリグサ科
Cyperaceae**カテゴリー**大分県 II
環境庁 掲載なし**選定理由** 県内の生育地は人里近くの林内に点在し、しばしば群生するが、その生育範囲は広くない。森林伐採や林道工事などの影響で、生育地の減少が懸念される。**県内分布** 耶馬溪地区，別府湾沿岸域**分布域** 本州(中～西部) 四国 九州(佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島 中国(北部・東北部)**生育環境** 低地の林縁や林内。**現 状** 常緑広葉樹林内の乾燥した林床に生え、森林伐採で衰退した生育地がある。**オニスゲ***Carex dickinsii*
Franch. et Savat.カヤツリグサ科
Cyperaceae**カテゴリー**大分県 IB
環境庁 掲載なし**選定理由** 県内の生育地は希で、個体数も少ない。多くは草原の谷沿い溪流辺に帯状に生育する。草原の開発や池畔の観光開発で消滅した生育地があり、絶滅の危険性が高い。**県内分布** 日田低地・丘陵地，玖珠丘陵地・山地，(九重火山群)**分布域** 北海道 本州 四国 九州(福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島**生育環境** 丘陵地の湿地や水流辺。**現 状** 湿地や水流辺に帯状に分布し、群生するが、生育地の面積は狭い。「九重火山群」の標本や文献記録はあるが、生育地は把握されていない。**備 考** 文献〔大井次三郎 Cypetaceae Japonicae 京都大学理学部紀要 Ser.B.18(1943)〕**ビロウドスゲ***Carex fedia* Nees
subsp. *miyabei* (Franch.) T. Koyamaカヤツリグサ科
Cyperaceae**カテゴリー**大分県 IB
環境庁 掲載なし**選定理由** 県内では主として高原の溪流辺や湿地に群生しているが、生育地一帯は土地開発が著しく進み、河岸工事なども伴って生育地が減少しており、絶滅の危険性が高くなっている。**県内分布** 玖珠丘陵地・山地，九重火山群**分布域** 北海道 本州 九州(熊本・大分・宮崎)**生育環境** 低山地の溪流辺や湿地。**現 状** しばしば群生するが、生育地は分断されていて、いずれも面積は狭い。集落付近では消滅した生育地が多い。**備 考** 九州は、分布の南限域にあたる。