

チュウゼンジスゲ

Carex longerostrata C. A. Mey.
var. *pallida* (Kitagawa) Ohwi

カヤツリグサ科
Cyperaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 国内の分布域は狭い。本県の生育地は野焼きされるススキ草原で、生育地は散在し、個体数は少ない。草原の植林や野焼きの停止などによる生育環境の変化で、生育地の減少が懸念される。

県内分布 九重火山群，由布・鶴見火山群，(大分川・大野川丘陵地)

分布域 本州(北～中部) 九州(大分)
朝鮮半島 中国(東北部)

生育環境 丘陵地から山地の草原。

現 状 「大分川・大野川丘陵地」の標本はあるが、その生育地は把握されていない。

備 考 北方寒冷地要素の植物。本県は、分布の南限域にあたる。

キノクニスゲ

Carex matsumurae Franch.

カヤツリグサ科
Cyperaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 II

選定理由 県内の生育地は、主として島や岬に分布し、生育する範囲は狭い。林の伐採、海岸工事などにより、生育地の消滅が懸念される。

県内分布 姫島・国東海岸，豊後水道域

分布域 本州(富山 三重以西) 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・大分)
朝鮮半島

生育環境 海岸の林縁や林内。

現 状 島や岬の林内は人為的な影響は少ないが、人里近くの生育地では消滅した所がある。

フサスゲ

Carex metallica Lév.

カヤツリグサ科
Cyperaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 掲載なし

選定理由 県内での生育地は極めて希。個体数も少なく、土地改変や採草などで絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 (中津・宇佐低地)，別府湾沿岸域

分布域 本州(山口) 四国 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島 台湾

生育環境 海岸の礫地や林縁。

現 状 生育地の周辺は公園広場や海水浴場になっていて、クロマツなどの株元に僅かに生育している。「中津・宇佐低地」の標本はあるが、その生育地は把握されていない。