

新型コロナワクチン接種を

よろしく

発症予防

重症化予防



ブラックジャックによろしく 佐藤秀峰



若者は


そうとも
限らん!

コロナに
かかっても重症化
しないんだろ?


若者でも
入院が必要なほど
重症化することが
あります。

回復後、後遺症で
悩んでいる人も
いるんだあ

新型コロナワクチンについて、
詳しく知りたい方はこちら



後遺症は、
「強いだるね」、「
「思考力の低下」、「
「味覚障害」、「
「脱毛」等の症状が
6ヶ月後でも
10〜20%程度
認められています。




接種後に起こる可能性のある症状(副反応)

- 新型コロナワクチンは、非常に高い効果があります。一方で、接種後に体内で免疫ができる過程で、**接種部位の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等**の症状が現れることがあります。



接種後の症状の経過・頻度

- いずれの症状も、大部分は接種の翌日をピークに発現し、数日以内に回復しました。
- 最も多く見られたのは**接種部位の痛み**で、1回目、2回目接種後いずれの場合も、接種翌日は80%以上の方に見られました。
- **発熱**や**全身倦怠感**、**頭痛**等は1回目よりも2回目の接種後の方が、症状の発現頻度が高くなる傾向がありました(下図)。



症状が出たときの対応

【発熱や痛み】

- 市販の解熱鎮痛薬(アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬[イブプロフェンやロキソプロフェン等])で対応いただけます。
- 発熱時には、水分を十分に摂取することをお勧めします。
- 妊娠・授乳中の方や胃潰瘍・腎機能障害・喘息などの持病のある方は、薬剤師や医師にご相談ください。



※症状が重い場合、長引く場合は、医療機関等への受診や相談をご検討ください。

接種後の生活

ワクチンの効果は高いですが、100%ではありません。ウイルスの変異による影響もあります。接種した後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。



ワクチン未接種者への偏見・差別をなくしましょう

ワクチン接種は強制ではありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。ワクチンを接種していない方への、差別、いじめ、職場や学校における不利益な取扱等は決して行ってはなりません。

