令和7年度　生態調査結果（果実品質）

令和8年4月20日

大分県農林水産研究指導センター農業研究部果樹グループカボス・中晩柑チーム(津久見市)

カボス（大分1号）　※調査樹変更

	Brix （%）					クエン酸 （%）					果汁歩合 （%）					
	R7	R6	R5	R4	平年	R7	R6	R5	R4	平年	R7	R6	R5	R4	平年	
7/10	－	9.4	8.9	10.3	9.3	－	5.70	5.06	5.67	5.45	－	15.6	13.0	11.2	11.4	7/10
7/20	10.5	9.1	9.2	9.8	9.2	5.33	5.64	5.55	5.91	5.87	16.7	18.4	19.7	18.8	18.6	7/20
7/30	10.3	9.9	10.1	9.7	9.6	5.80	5.79	5.82	6.32	6.16	22.0	24.1	24.1	23.3	22.4	7/30
8/10	9.8	10.1	9.8	10.3	9.8	5.37	6.07	5.49	6.28	6.08	24.9	27.1	26.4	25.6	27.2	8/10
8/20	9.5	11.0	9.2	10.1	9.8	5.55	5.92	5.00	6.14	5.87	25.7	29.1	32.0	28.1	28.8	8/20
8/30	9.3	10.1	8.9	10.4	9.5	5.41	5.50	4.79	5.84	5.58	31.4	30.5	34.1	33.1	31.8	8/30
9/10	9.1	9.9	8.8	9.8	9.3	5.25	5.11	4.99	5.84	5.39	32.1	32.5	36.7	35.4	33.9	9/10
9/20	9.0	9.6	8.4	9.3	9.0	4.94	4.85	4.80	5.60	5.31	34.1	33.5	38.4	37.9	35.4	9/20
9/30	8.7	9.2	8.4	9.7	8.8	4.60	4.74	4.45	5.51	5.07	34.5	36.4	37.5	39.3	36.8	9/30
10/10																10/10
10/20																10/20
10/30																10/30
11/10																11/10
11/20																11/20
11/30																11/30
12/10																12/10
12/20																12/20

おおいた早生　※調査樹変更

	Brix （%）					クエン酸 （%）					
	R7	R6	R5	R4	平年	R7	R6	R5	R4	平年	
7/10											7/10
7/20											7/20
7/30	8.1	7.2	8.2	7.5	7.8	2.33	2.73	2.13	3.30	2.86	7/30
8/10	8.3	7.6	8.2	7.8	8.3	1.85	2.36	1.89	2.71	2.20	8/10
8/20	8.5	8.1	8.5	8.0	8.6	1.21	1.53	1.09	1.82	1.77	8/20
8/30	9.3	7.7	8.6	8.3	8.9	1.07	1.18	0.92	1.47	1.38	8/30
9/10	10.0	7.6	9.0	8.6	9.0	0.83	1.00	0.73	1.16	1.08	9/10
9/20	9.6	8.1	9.2	8.7	9.3	0.62	0.80	0.73	0.84	0.91	9/20
9/30	11.2	8.2	8.7	9.3	9.5	0.61	0.71	0.65	0.80	0.78	9/30
10/10											10/10
10/20											10/20
10/30											10/30
11/10											11/10
11/20											11/20
11/30											11/30
12/10											12/10
12/20											12/20

大津四号　※調査樹変更

	Brix （%）					クエン酸 （%）					
	R7	R6	R5	R4	平年	R7	R6	R5	R4	平年	
7/10											7/10
7/20											7/20
7/30											7/30
8/10	8.5		8.7	8.1	9.7	3.67		3.32	4.08	4.05	8/10
8/20	8.2		8.0	8.4	9.6	3.38		3.01	3.83	3.72	8/20
8/30	8.8		7.8	8.3	9.6	3.20		2.87	3.83	3.40	8/30
9/10	9.0		8.0	8.1	9.3	2.64		2.39	3.88	2.92	9/10
9/20	8.9	8.6	7.8	7.9	8.7	2.09	2.62	1.98	2.69	2.30	9/20
9/30	8.7		8.0	7.9	8.7	1.76		1.68	2.80	1.95	9/30
10/10	9.0	7.9	8.5	7.7	8.8	1.46	1.95	1.39	2.26	1.58	10/10
10/20	9.2	7.8	9.0	8.0	9.3	1.05	1.48	1.13	1.87	1.31	10/20
10/30	9.5	7.5	9.5	8.4	9.8	0.87	1.03	1.11	1.04	1.04	10/30
11/10	10.3	8.2	10.2	9.1	10.4	0.81	0.80	1.03	1.17	0.96	11/10
11/20	10.7	8.2	10.6	9.6	10.7	0.83	0.72	1.03	1.00	0.90	11/20
11/30	10.7	8.5	10.8	10.2	11.0	0.81	0.64	0.97	0.89	0.83	11/30
12/10	11.0	8.8	11.0	10.8	11.6	0.72	0.66	0.92	0.86	0.80	12/10
12/20	11.2	9.2	11.2	11.2	11.8	0.74	0.60	0.84	1.05	0.81	12/20

太田ポンカン　※調査樹変更

	Brix （%）					クエン酸 （%）					
	R7	R6	R5	R4	平年	R7	R6	R5	R4	平年	
9/20	8.4	7.7	8.4	8.3	8.0	5.15	4.02	4.10	4.42	4.26	9/20
10/20	8.9	8.1	9.4	9.0	8.7	2.91	2.06	2.59	2.33	2.11	10/20
11/20	10.6	8.5	10.5	10.5	9.9	1.56	1.11	1.87	1.23	1.24	11/20
12/20	11.6	10.1	11.0	11.4	10.8	1.18	0.80	1.52	0.83	0.89	12/20
1/20											1/20
2/20											2/20
3/20											3/20
4/20											4/20
5/20											5/20

不　知　火　※調査樹変更

	Brix （%）					クエン酸 （%）					
	R7	R6	R5	R4	平年	R7	R6	R5	R4	平年	
9/20	9.8	9.0	9.0	8.6	8.9	3.05	3.21	3.34	3.18	3.59	9/20
10/20	10.3	8.9	10.3	9.5	9.5	2.02	1.94	2.45	2.06	2.23	10/20
11/20	11.5	10.4	11.9	11.8	11.2	1.64	1.44	2.09	1.65	1.65	11/20
12/20	13.1	12.4	13.1	13.7	12.8	1.58	1.47	1.73	1.49	1.39	12/20
1/20	14.0	13.9	14.8	15.3	14.2	1.52	1.43	1.56	1.42	1.30	1/20
2/20	15.7	14.6	15.6	17.1	15.4	1.44	1.21	1.37	1.23	1.15	2/20
3/20	15.8	15.2	17.1	17.9	16.4	1.27	1.10	1.39	1.20	1.12	3/20
4/20	15.3	16.0	16.3	17.8	16.8	1.17	1.06	1.26	1.18	1.07	4/20
5/20		16.0	17.6	18.4	17.2		0.99	1.15	1.08	1.03	5/20

セミノール　※調査樹変更

	Brix （%）					クエン酸 （%）					
	R7	R6	R5	R4	平年	R7	R6	R5	R4	平年	
9/20	9.1	8.3	8.1	8.4	8.3	4.59	3.92	4.73	4.91	4.84	9/20
10/20	9.9	8.7	9.5	9.4	9.1	3.63	2.86	3.71	4.14	3.79	10/20
11/20	12.0	10.0	11.2	11.0	10.5	2.86	2.30	3.60	3.15	2.97	11/20
12/20	11.8	10.9	12.1	11.8	11.6	2.77	1.83	2.99	3.04	2.66	12/20
1/20	13.6	11.5	13.0	12.7	12.6	2.44	1.75	2.74	2.77	2.42	1/20
2/20	14.2	11.5	13.3	13.2	13.1	2.42	1.86	2.67	2.32	2.32	2/20
3/20	14.0	12.6	13.8	13.0	13.5	1.89	1.59	2.18	2.05	1.94	3/20
4/20	13.6	12.6	12.8	12.5	13.4	1.68	1.55	1.83	1.83	1.76	4/20
5/20		12.7	13.3	12.4	13.4		1.40	1.82	1.56	1.61	5/20

大分果研4号　※調査樹変更

	Brix （%）					クエン酸 （%）					
	R7	R6	R5	R4	平年	R7	R6	R5	R4	平年	
9/20	8.3	8.0	8.1	7.8	7.8	1.70	1.09	1.52	1.92	1.85	9/20
10/20	9.0	8.4	10.0	8.9	8.9	1.01	1.18	1.11	1.34	1.18	10/20
11/20	10.4	9.7	11.4	10.9	10.4	0.84	0.90	0.95	0.94	0.91	11/20
12/20	11.6	11.2	11.9	11.1	11.1	0.67	0.76	0.77	0.87	0.79	12/20
1/20											1/20
2/20											2/20
3/20											3/20
4/20											4/20
5/20											5/20

：貯蔵果実を分析

平年値は直近10年間(H24～R3年)の平均

※「大津四号」「セミノール」「カボス（大分1号）」は調査樹変更のため過去の値・平年値は参考値として記

※「大津四号」はH30年度、「おおいた早生」はR1年度、「カボス(大分1号)」はR4年度から調査樹変更。

※R1年度の「大津四号」は調査樹1本のデータ。

※R4年度の「太田ポンカン」「不知火」は一部、「セミノール」は全部の調査樹を変更。

※R5年度の「太田ポンカン」「不知火」は一部、「セミノール」は全部の調査樹を変更。

※R6年度の「太田ポンカン」は一部、「不知火」「セミノール」「大分果研4号」は全部の調査樹を変更。

※R7年度の「大分1号」は調査樹を一部変更。