

緊急赤潮情報 2

令和 8 年 7 月 13 日

大分県農林水産研究指導センター水産研究部

◎有害種のヘテロシグマ・アカシオが警戒密度を超えて確認されています。
魚介類の管理にご注意ください。

発生場所：猪串湾

発生日時：令和 8 年 7 月 13 日～

プランクトン種類：ヘテロシグマ・アカシオ（有害プランクトン）

プランクトン数：最高細胞数 54,300 細胞/ml （灘内漁港（森崎） 表層）

※詳細は別添参照

（ヘテロシグマ・アカシオの注意点）

- ・警戒密度：50,000 細胞/ml 注意密度：5,000 細胞/ml
- ・ヘテロシグマ・アカシオは魚介類に斃死を及ぼす有害な赤潮プランクトンです。特にシマアジに有害です。
- ・鉛直運動するため午前中に海色がよくても、午後から着色し被害を発生することがあります。
- ・パッチ状になった赤潮は潮流や風の影響で移動し養殖、蓄養中の魚介類に被害をおよぼすことがあります。

赤潮発生場所での対応

- ・ 投餌は控える。
- ・ 赤潮海域へ魚介類を入れない。
- ・ 赤潮海域から魚介類を避難する
- ・ 蓄用は控える。

