

表1 佐伯湾赤潮プランクトン調査結果 令和8年度7月28,29日 単位:細胞数/㎖

採集地点	調査時間	水深 (m)	水温 (℃)	塩分 (PSU)	DO (mg/l)	シャットネラ sp.	カレニア ・ミキモイ	ヘテロシグマ ・アカシオ	マーガレフィディニウム (旧)コクロディニウム ホリクリコイデス	ノクチルカ ・シンチランス
1. 夏井沖	10:35	0	26.1	33.18	6.3	0	0	0	0	
		5	24.8	33.35	6.7	0	0	0	0	
		15	24.2	33.41	7.3	0	0	0	0	
		25	24.0	33.57	7.4	0	0	0	0	
		35	23.6	33.60	6.7	0	0	0	0	
2. 長田沖	10:57	41	22.5	33.57	6.6	0	0	0	0	
		0	26.4	32.51	6.3	0	0	0	0	
		5	24.4	33.30	7.3	0	0	0	0	
		0	26.6	33.44	6.7	0	0	0	0	
		5	25.9	33.40	7.0	0	0	0	0	
3. 片白島	9:12	0	26.6	33.44	6.7	0	0	0	0	
		5	25.9	33.40	7.0	0	0	0	0	
4. 小田代	9:28	0	28.2	32.89	7.2	0	0	0	0	
		5	25.9	33.44	7.2	0	0	0	0	
5. 沖松浦漁港	9:36	0	28.6	33.14	7.9	0	0	0	0	
		5	26.2	33.47	8.1	0	0	0	0	
6. 鶴見振興局裏	9:39	0	28.3	33.26	7.5	0	0	0	0	
		5	26.3	33.51	8.0	0	0	0	0	
7. 鶴見ポンツーン	9:42	0	28.3	33.03	7.1	0	0	0	0	600
		2	27.6	33.23	7.5	0	0	0	0	
		5	26.1	33.49	7.4	0	0	0	0	
		10	25.3	33.58	7.4	0	0	0	0	
		11.5	25.2	33.57	7.3	0	0	0	0	
8. 石間	9:18	12.5	25.1	33.60	7.1	0	0	0	0	
		0	26.3	33.30	7.0	0	0	0	0	
		5	25.2	33.59	7.4	0	0	0	0	
9. 霞ヶ浦	9:37	0	29.7	32.99	7.6	0	0	0	0	
		5	25.9	33.61	7.5	0	0	0	0	
10. 守後	9:40	0	28.8	33.16	7.2	0	0	0	0	
		5	26.4	33.55	7.4	0	0	0	0	
11. 片神	10:50	0	29.1	32.85	7.4	0	0	0	0	
		5	26.9	33.57	7.4	0	0	0	0	
12. 片神～彦島	10:56	0	29.1	32.99	7.6	0	0	0	0	
		5	26.8	33.55	7.0	0	0	0	0	
13. 水試前	11:09	0	27.0	33.37	6.4	0	0	0	0	1,200
		5	25.4	33.38	7.0	0	0	0	0	

※0mの水温・塩分・DOはクロロテックの0.5mの測定データによる
※地点1,2は7月28日、その他地点は7月29日に調査
参考:赤潮注意・警戒密度(単位:細胞数/㎖)

赤潮プランクトン	注意密度	警戒密度
シャットネラ spp.	10以上	100以上
ヘテロシグマ・アカシオ	5000以上	50000以上
カレニア・ミキモイ	200以上	2000以上
マーガレフィディニウム・ホリクリコイデス	30以上	300以上

* 警戒密度は漁業被害が想定される密度です。
* アワビ、サザエ等ではカレニア・ミキモイで100～200細胞/㎖で斃死する可能性があります。
* マグロに関しては、赤潮注意・警戒密度に1/10を乗じた細胞密度とします。

HAIセンサーで観測された有害プランクトン(カレニア・ミキモイ、シャットネラ属)情報

採水地点	調査時間	水深(m)	水温(℃)	FSI値
⑭長田沖2	7月29日	0	25.3	1.73
	9:21	5	24.6	1.73

※有害プランクトン検出:FSI値が1.95以上

連絡事項

有害プランクトンは確認されませんでした。

7.鶴見ポンツーンと13.水試前で、ノクチルカ・シンチランス(夜光虫)が高密度で確認されています。
(表層 最大1,200 細胞/㎖ 着色あり)

今後の細胞密度の推移にご注意ください。





図. 調査定点図

【ドローン写真】



水試筏



浅海井漁港の豊洋浮き桟橋