

令和8年度 7月 水稲管理情報 第1号

昨年は、**高温・少雨の影響**で以下の課題がありました。

- ⚠️ 充実不足による**白未熟粒が発生**し、品質が低下した。
- ⚠️ 湯水により初期除草剤が効かず、**雑草が旺盛**になった。



そこで、今年は**充実度の向上と雑草の抑制**を徹底しましょう！

充実度の向上のために中干しをしましょう！

中干しは、過剰分けつを抑制し籾数過多を防ぐため、充実度の向上につながります。

- 🌿 1株に茎が約20本程度確保できたら開始しましょう。
- 🌿 田面に約1cmのひび割れができる程度に乾かしてください。

【ポイント】

ひび割れが大きすぎると根が過度に切れるおそれがあるため、注意深く観察してください。

中干しを十分に行えないところでは、できるだけ落水状態の期間をとるように実施してください。

雑草抑制のために雑草管理をしましょう！

- 🌿 中後期除草剤は、初期除草剤で雑草が残った場合に使用しましょう。

～中後期除草剤一覧～

使用時期	薬剤名	対象	備考
移植後7日～ ノビエ4葉	クリンチャー	ノビエ	深水散布
移植後15日～	バサグラン	広葉	落水または深水散布
移植後14日～ ノビエ4葉	レブラスギア	ノビエ・広葉	落水または浅い深水 散布
移植後20日～ ノビエ6葉	ワイドアタックSC	ノビエ・広葉	

- ⚠️ 剤型や使用量等は製品のラベルで必ず確認してください。

