

出穂直前！病害虫防除を徹底しよう！！

カメムシ吸汁害

【近年、竹田市で多く見られる主な病害虫】

どの病害虫も品質低下・減収につながります！



〈稲こうじ病〉

・前年発生が多い圃場や雨が多い年に多発する

・対策：出穂前10～21日で防除

〈薬剤例〉Zボルドー粉剤DL

〈紋枯病〉

・株元に「ダイヤ型」の病斑がみられる

・高温・多湿で多発する

・対策：幼穂形成～穂孕期に防除

〈薬剤例〉バリダシン液剤5




本田防除剤(いもち・カメムシ・ウンカ用の剤)は、

例年の発生具合や今年の環境を考慮し、**防除時期**を決定しよう！

〈斑点カメムシ類を優先して防除する場合〉

・穂揃期とその7～10日後の2回防除

※出穂2週間前まで、適時畦畔草刈りを行うと、より発生を防げます



畦畔草刈り

移植

活着期

分けつ期

穂孕期

出穂期

穂揃期

登熟期



〈いもち病を優先して防除する場合〉

・穂孕期と穂揃期の2回防除

〈薬剤例〉

ビームエイトスタークルゾル

ブレードスタークルRゾル

など

経験の浅い農家にオススメ！「**水稻勉強会**」開催中です！

・次回は8月30日(日) 9:30から、竹田市古園地域の圃場で開催。

・参加の申し込みは豊肥振興局 地水二班(63-1301)までご連絡下さい！

