



1. 中干し

必要茎数（下記参照）を確保できたら中干しを開始しましょう。
田面に小さなヒビが入り、足跡が付かない程度で、5～7日間実施しましょう。強すぎる中干しは根にダメージを与えます！

【中干し開始目安】

| 栽植密度 (株/坪) | 株間 (条間は30cm) | 必要茎数 (本/株) |
|---------------|-----------------|---------------|
| 55 | 20 | 19~20 |
| 50 | 22 | 21~22 |
| 44 | 25 | 24~25 |

中干し後～穂ばらみ期は、間断灌水をしましょう。急激な湛水は根腐れを引き起こします。

中干しの効果

- ・ガス抜きと根への酸素供給
- ・倒伏防止
- ・無効分げつ防止
- ・収穫をしやすくする

2. 中後期除草剤

田植時に除草剤を施用しなかったり、効いていない場合は、中後期除草剤を散布しましょう。（ラベルの裏をよく見て使用しましょう）

| 適用雑草 | 薬剤名 | 使用時期 | 収穫前 使用日数 | 散布時の田 水面 |
|----------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| ヒエ | クリンチャー（1キロ粒剤、ジャンボ剤） | 移植後7日～ル ¹ I4葉期 | 30日 | 湛水 |
| | クリンチャーEW（乳剤） | 移植後20日～ル ¹ I6葉期 | 30日 | 湛水or落水 |
| | トドメMF1キロ粒剤 | 移植後14日～ル ¹ I5葉期まで | 50日 | 湛水 |
| 広葉 | バサグラン液剤 | 移植後15～55日 | 50日 | 落水 |
| | バサグランエアー1キロ粒剤 | 移植後15～55日 | 60日 | 落水 |
| ヒエ 広葉 | クリンチャーバスME液剤 | 移植後15日～ル ¹ I5葉期 | 50日 | 落水 |
| | レプラス1キロ粒剤 | 移植後14日～ル ¹ I4葉期 | 60日 | 湛水 |
| | レプラスジャンボ※ | 移植後14日～ル ¹ I4葉期 | 60日 | 湛水 |
| | ワイドアタックSC（水和剤） | 移植後20日（稲5葉期以降）～ル ¹ I6葉期 | 30日 | 落水 |

※レプラスはオオナリ、みなちから、モミロマン、タカナリ等の品種で使用不可（薬害発生するため）

3. 熱中症予防

7月以降は熱中症が起こりやすい時期です。気をつけましょう！
脱水症状にならないための、こまめな水分・塩分補給をして、休憩を挟みながら作業をしましょう。



大分県農業協同組合豊肥事業部農産課 63-4994
大分県豊肥振興局生産流通部集落営農・水田畑地化第一班 63-1301



豊肥振興局HPに過去の管理情報を掲載しています！