

令和7年播麦類作柄判定試験結果（第7回）

令和8年7月1日

大分県農林水産研究指導センター

農業研究部 水田農業グループ

1.平坦地（宇佐水田グループ場内）での成熟期調査、収量・品質調査結果概況（2026年6月29日時点）

【適期播（2025年11月20日播種）】

◆ハルアカネ（裸麦）

- ①成熟期：平年並（平年差：±0）
- ②収穫時倒伏程度：平年よりやや小さい（平年差：-0.5）
- ③千粒重：平年並（平年比：102）
- ④子実重：平年より軽い（平年比：90）
- ⑤屑麦重歩合：平年より多い（平年差：+10ポイント）
- ⑥検査等級：平年よりやや劣る（平年差：+1.0）

◆ニシノホシ（二条大麦）

- ①成熟期：平年並（平年差：±0）
- ②収穫時倒伏程度：平年より大きい（平年差：+2.2）
- ③千粒重：平年よりやや重い（平年比：105）
- ④子実重：平年並（平年比：96）
- ⑤屑麦重歩合：平年並（平年差：+1.2ポイント）
- ⑥検査等級：平年よりやや劣る（平年差：+1.7）

◆チクゴイズミ（小麦）

- ①成熟期：平年よりやや早い（平年差：-3）
- ②収穫時倒伏程度：平年よりやや大きい（平年差：0.5）
- ③千粒重：平年よりやや軽い（平年比：97）
- ④子実重：平年より重い（平年比：113）
- ⑤屑麦重歩合：平年並（平年差：+0.2ポイント）
- ⑥検査等級：平年並（平年差：-0.4）

表1 出芽、出穂、成熟期調査結果（宇佐水田G場内、適期播）

播種期 (月.日)	品種名	播種年	出芽期 (月.日)	出穂期 (月.日)	成熟期 (月.日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/m ²)	倒伏程度 (収穫時)
適期播 11.20	ハルアカネ (裸麦)	2025	12.10	3.31	5.14	95	6.7	490	2.0
		平年差・比	+5	-2	±0	116	112	107	-0.5
		前年差・比	+7	-3	-1	127	118	124	+0.5
	ニシノホシ (二条大麦)	2025	12.08	3.31	5.15	93	7.0	718	3.5
		平年差・比	+5	±0	±0	108	113	99	+2.2
		前年差・比	+6	-3	-1	113	119	110	+3.0
	チクゴイズミ (小麦)	2025	12.08	4.02	5.24	94	9.1	546	2.0
		平年差・比	+5	+2	-3	107	111	103	±0.0
		前年差・比	+7	-4	-4	111	110	118	-0.3
	はるみずき (小麦)	2025	12.08	3.27	5.24	86	10.0	417	2.0

注1)平年値は2020～2024年播の5か年の平均である。

注2)差・比の値において符号のあるものは差、ないものは比を表す。

注3)倒伏程度は無(0)、微(1)、少(2)、中(3)、多(4)、甚(5)の6段階で評価する。

表2 収量品質調査結果（宇佐水田G場内、適期播）

播種期 (月.日)	品種名	播種年	一穂 粒数	千粒重 (g)	子実重 (kg/10a)	屑麦重 歩合 (%)	わら重 (kg/10a)	タンパク 含有率 (%)	検査 等級
適期播 11.20	ハルアカネ (裸麦)	2025	54	32.3	351	34.6	418	10.1	4.0
		平年差・比	97	102	90	+10.0	114	123	+1.0
		前年差・比	98	95	80	+24.4	129	107	+1.0
	ニシノホシ (二条大麦)	2025	24	43.9	326	34.3	454	9.4	4.0
		平年差・比	101	105	96	+1.2	106	101	+1.7
		前年差・比	116	98	80	+25.1	104	99	+2.0
	チクゴイズミ (小麦)	2025	40	38.2	628	1.2	447	8.9	2.0
		平年差・比	98	97	113	+0.2	85	96	-0.4
		前年差・比	114	98	145	+0.4	80	92	-0.5
	はるみずき (小麦)	2025	42	38.1	555	2.5	419	12.6	4.0

注1)～3)は表1に同じ。

注4)収量調査は水分12.5%換算。タンパク質含有率は水分13.5%換算。

篩目は大麦2.5mm、裸麦・小麦は2.0mm。

注5)検査等級：1等上・中・下、2等、規格外を1～5で示す。

【晩播（2025年12月16日播種）】

◆ニシノホシ（二条大麦）

- ①成 熟 期：平年よりやや早い（平年差：-3）
- ②収穫時倒伏程度：平年より大きい（平年差：+1.4）
- ③千 粒 重：平年よりやや軽い（平年比：97）
- ④子 実 重：平年よりやや軽い（平年比：97）
- ⑤屑麦重歩合：平年より多い（平年比：+16.0 ポイント）
- ⑥検 査 等 級：平年よりやや劣る（平年差：+1.2）

◆チクゴイズミ（小麦）

- ①成熟期：平年よりやや早い（平年差：-3）
 ②収穫時倒伏程度：平年よりやや大きい（平年差：+0.6）
 ③千粒重：平年並（平年比：101）
 ④子実重：平年より重い（平年比：109）
 ⑤屑麦重歩合：平年より多い（平年比：+5.4 ポイント）
 ⑥検査等級：平年よりやや優れる（平年差：-1.0）

表3 出芽、出穂、成熟期調査結果（宇佐水田G場内，晩播）

播種期 (月.日)	品種名	播種年	出芽期 (月.日)	出穂期 (月.日)	成熟期 (月.日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/m ²)	倒伏程度 (収穫時)
晩播 12.16	ニシノホシ (二条大麦)	2025	1.20	4.09	5.19	93	6.6	754	3.0
		平年差・比	-11	-1	-3	111	100	137	+1.4
		前年差・比	-21	-8	-9	109	94	154	+2.0
	チクゴイズミ (小麦)	2025	1.20	4.12	5.28	87	8.4	499	2.0
		平年差・比	-12	±0	-3	104	108	106	+0.6
		前年差・比	-21	-5	-7	106	120	114	+0.5
	はるみずき (小麦)	2025	12.30	4.07	5.28	83	9.5	516	+1.5

注1)平年値は2020～2024年播の5か年の平均である。

注2)差・比の値において符号のあるものは差、ないものは比を表す。

注3)倒伏程度は無(0)、微(1)、少(2)、中(3)、多(4)、甚(5)の6段階で評価する。

表4 収量品質調査結果（宇佐水田G場内，晩播）

播種期 (月.日)	品種名	播種年	一穂 粒数	千粒重 (g)	子実重 (kg/10a)	屑麦重 歩合 (%)	わら重 (kg/10a)	タンパク 含有率 (%)	検査 等級
晩播 12.16	ニシノホシ (二条大麦)	2025	23	43.4	305	43.6	368	8.9	4.0
		平年差・比	99	97	97	+16.0	109	97	+1.2
		前年差・比	99	88	76	+34.9	116	98	+2.0
	チクゴイズミ (小麦)	2025	37	38.1	555	6.3	540	8.9	2.0
		平年差・比	88	101	109	+5.4	140	98	-1.0
		前年差・比	100	98	116	+5.3	165	98	-1.5
	はるみずき (小麦)	2025	38	34.5	571	1.1	439	13.2	4.0

注1)～3)は表3に同じ。


注4)収量調査は水分12.5%換算、タンパク質含有率は水分13.5%換算。

篩目は大麦2.5mm、小麦は2.0mm。

注5)検査等級：1等上・中・下、2等、規格外を1～5で示す。


出穂期・成熟期(適期播)の過去実績

作柄判定試験(水田農業グループ、宇佐)



出穂期・成熟期(晩播)の過去実績

作柄判定試験(水田農業グループ、宇佐)



2. 気象概況 (2025 年 11 月 5 半旬～6 月 1 半旬) 観測地：宇佐市北宇佐，標高 30m

1) 気 温：2 月 4 月，5 月は平年を上回り、その他の月は平年並で推移した。期間中の気温は、平年よりやや高かった。

(期間中の平年差：+1.3℃)

2) 降 水 量：12 月 3，5 半旬、4 月 5，6 半旬は平年を大きく上回り、その他の月は平年を下回って推移した。期間中の降水量は平年並であった。

(期間中の平年比：100，期間中の降水量 512mm，平年 510mm)

3) 日照時間：4 月、6 月は平年を下回り、その他の月は平年を上回って推移した。

期間中の日照時間は、平年よりやや多かった。

(期間中の平年比：107，期間中の日照時間 1175 時間，平年 1098 時間)

3. 本年作柄のまとめ

1) 生育状況

(1) 適期播 (2025 年 11 月 20 日播種)

播種後の乾燥により、出芽にばらつきが見られ、出芽期はいずれも麦種も平年より遅れた。1 月 2 半旬から気象条件に恵まれ、草丈，茎数は平年並となった (2 月 10 日時点)。出穂期はいずれの麦種も平年並であった (平年差：ハルアカネ-2 日，ニシノホシ±0 日，チクゴイズミ+2 日)。成熟期は裸麦および二条大麦が平年並 (同差：ハルアカネ±0 日，ニシノホシ±0 日)、小麦は平年よりやや早かった (同差：チクゴイズミ-3 日)。

(2) 晩播 (2025 年 12 月 16 日播種)

播種後の降雨と温暖傾向により、いずれの麦種も出芽は良好で、出芽期は平年より早かった。(同差：ニシノホシ-11 日，チクゴイズミ-12 日)。加えて、1,2 月の適度な降雨と高温傾向によりいずれの麦種も草丈は平年より高く、茎数も平年より多かった (2 月 10 日時点)。しかし、3 月 2 半旬からの低温により葉齢の進展は穏やかになった。出穂期はいずれの麦種も平年並であった (同差：ニシノホシ-1 日，チクゴイズミ±0 日)。成熟期はいずれの麦種も平年よりやや早かった。(同差：ニシノホシ，チクゴイズミ：-3 日)。

2) 収量および品質

(1) 適期播 (2025 年 11 月 20 日播種)

● ハルアカネ (裸麦)

穂数は平年よりやや多かった (平年比：107)。千粒重は平年並であった (同比：102)。子実重は平年より軽かった (同比：90)。屑麦重歩合は平年より多かった (同差：+10 ポイント)。検査等級は充実不足で 2 等と平年よりやや劣った。

4 月 5～6 半旬の多雨と日照不足の影響で登熟不良となり、低収となった。また、1 月 1 半旬から 2 月 4 半旬の少雨による肥効の抑制と、その後 3 月 1 半旬までの降雨による肥料の遅出が遅れ穂の発生につながり、屑麦増加の要因の一つとなったと考えられた。

● ニシノホシ (二条大麦)

穂数は平年並であった (同比：99)。千粒重は平年よりやや重かった (同比：105)。子実重は平年並であった (同比：96)。屑麦重歩合は平年並であった (同差：+1.2 ポイント)。検査等級は充実不足で 2 等と平年よりやや劣った。

4 月 23 日、24 日の多雨の影響で倒伏が生じ、屑麦の発生につながった。しかし千粒重が増加していることから、倒伏の発生による悪影響を補い、収量は平年並となった。

- チクゴイズミ（小麦）

穂数は平年よりやや多かった（同比：103）。千粒重は平年よりやや軽かった（同比：97）。子実重は平年より重かった（同比：113）。屑麦重歩合は平年並であった（同差：+0.2ポイント）。検査等級は1等中と平年並であった。

千粒重は平年よりやや軽かったものの、穂長が平年より長く、穂数が平年より増加したため、多収につながったと考えられた。

（2）晩播（2025年12月16日播種）

- ニシノホシ（二条大麦）

穂数は平年より多く（同比：137）、千粒重は平年よりやや軽かった（同比：97）。子実重は平年並だった（同比：97）。屑麦重歩合は平年より多かった（同差：+16.0ポイント）。検査等級は充実不足で2等と平年よりやや劣った。

4月23日、24日の多雨に伴う倒伏の発生により各穂への養分供給不足および受光量の低下を招き、加えて肥料の遅出による遅れ穂の発生が屑麦増加の一因になったと考えられた。

- チクゴイズミ（小麦）

穂数は平年よりやや多かった（同比：106）。千粒重は平年並であった（同比：101）。子実重は平年より重かった（同比：109）。屑麦重歩合は平年よりやや多かった（同差：+5.4ポイント）。検査等級は1等中と平年より優れた。

4月23日、24日の多雨に伴う倒伏の発生により各穂への養分供給不足および受光量の低下を招き、加えて肥料の遅出による遅れ穂の発生が屑麦増加の一因になったと考えられた。しかし、穂数の増加および、千粒重は平年並であったため、屑麦の増加を補って多収となった。

4. 試験概要

(適期播)

供試品種	(裸 麦)ハルアカネ (二条大麦)ニシノホシ (小 麦)チクゴイズミ、はるみずき
栽培様式	畝立二条播、畝幅140cm、播幅15cm、 播種量約6kg/10a相当(143粒/m ²) ※裸麦のみ172粒/m ²
播種期	11月20日(基準日:11月20日)
窒素施肥量	基肥一分げつ肥－穂肥 0.4－0.2－0.2 kg/a, 堆肥 1000kg/10a
生育調査基準日	1/5, 1/20, (1/30), 2/10, (2/20), 3/3, (3/13), 3/23, 成熟期 注)()は葉齢調査のみ

(晩播)

供試品種	(二条大麦)ニシノホシ (小 麦)チクゴイズミ
栽培様式	畝立二条播、畝幅140cm、播幅15cm、 播種量約9kg/10a相当(200粒/m ²)
播種期	12月16日(基準日:12月15日)
窒素施肥量	基肥一分げつ肥－穂肥 0.4－0.2－0.2 kg/a, 堆肥 1000kg/10a
生育調査基準日	(1/30), 2/10, (2/20), 3/3, (3/13), 3/23, 4/3, 成熟期 注)()は葉齢調査のみ

地点	麦種	品種	播種年	播種期 (月・日)	出芽期 (月・日)	出芽 日数 (日)	出芽 の 良否	苗立数 (本/㎡)	出芽率 (%)	1月5日				1月20日					1月30日		2月10日						2月20日		3月3日							
										草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	葉齢 (L)	調査日 (月・日)	草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	葉齢 (L)	幼穂 (mm)	幼稈 (mm)	調査日 (月・日)	葉齢 (L)	調査日 (月・日)	草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	葉齢 (L)	幼穂 (mm)	幼稈 (mm)	調査日 (月・日)	葉齢 (L)	調査日 (月・日)	草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	葉齢 (L)	乾物重 (g/㎡)	幼穂 (mm)	幼稈 (mm)	調査日 (月・日)
水田農業グループ(宇佐)	適期播 裸麦	ハルアカネ	2025	11.20	12.10	20	良	151	88	12	306	3.7	1.06	15	676	5.3	1.0	2.3	1.20	5.7	1.30	19	901	6.7	2.2	4.2	2.12	7.5	2.20	34	880	9.6	204	9.8	96.9	3.04
			平年	11.19	12.05	16	良	143	83	11	336	3.4	1.05	13	567	4.7	0.8	3.4	1.19	5.5	1.30	19	897	6.2	1.9	4.9	2.10	6.9	2.20	30	1060	8.1	179	4.9	45.1	3.04
			平年差・比	+1	+5	+4	—	106	+5	109	91	+0.3	+1	115	119	+0.6	125	68	+1	+0.2	±0	100	100	+0.5	116	86	+2	+0.6	±0	113	83	+1.5	114	200	215	±0
			前年差・比	±0	+7	+7	—	98	-1	92	71	+0.2	-1	107	125	+0.8	111	88	±0	+0.4	±0	106	114	+0.9	105	93	±0	+1.1	±0	131	90	+2.0	150	213	283	-1
			2024	11.20	12.03	13	良	154	89	13	429	3.5	1.07	14	542	4.5	0.9	2.6	1.20	5.3	1.30	18	789	5.8	2.1	4.5	2.12	6.4	2.20	26	975	7.6	136	4.6	34.3	3.05
			2023	11.21	12.21	30	中	123	71	10	158	2.9	1.05	11	296	4.3	0.7	2.1	1.19	4.8	1.30	18	581	5.7	1.6	4.0	2.08	6.7	2.20	29	836	8.1	139	4.1	27.3	3.04
			2022	11.18	11.30	12	良	138	80	10	305	3.3	1.05	13	673	4.8	0.6	2.4	1.18	5.5	1.30	18	904	6.3	1.6	3.1	2.10	7.2	2.20	31	1136	8.1	200	4.4	40.2	3.03
			2021	11.19	12.04	15	良	148	86	11	373	3.6	1.05	12	569	4.7	0.8	4.4	1.20	5.7	1.31	17	972	6.2	1.8	6.1	2.10	6.7	2.21	25	1199	7.4	169	3.8	19.5	3.03
			2020	11.18	11.29	11	良	153	89	12	415	3.8	1.05	13	753	5.1	1.1	5.7	1.20	6.1	1.29	22	1237	6.8	2.4	6.6	2.10	7.5	2.19	40	1155	9.4	249	7.5	104.0	3.03
		ニシノホシ	2025	11.20	12.08	18	良	129	90	10	276	4.2	1.06	13	702	5.8	1.6	3.0	1.20	6.5	1.30	19	1207	7.3	2.5	5.3	2.12	8.3	2.20	41	1031	9.8	166	21.3	146.7	3.04
			平年	11.19	12.03	14	良	139	97	11	484	4.0	1.05	12	884	5.2	1.3	3.9	1.19	6.0	1.30	21	1180	6.6	2.3	8.6	2.10	7.4	2.20	36	1274	8.5	209	9.0	77.1	3.04
			平年差・比	+1	+5	+4	—	93	-7	91	57	+0.2	+1	108	79	+0.6	123	77	+1	+0.5	±0	90	102	+0.7	109	62	+2	+0.9	±0	114	81	+1.3	79	237	190	±0
			前年差・比	±0	+6	+6	—	91	-9	91	52	+0.4	-1	118	102	+0.7	123	107	±0	+0.7	±0	100	115	+0.9	100	100	±0	+1.4	±0	141	95	+1.7	118	296	234	-1
			2024	11.20	12.02	12	良	142	99	11	532	3.8	1.07	11	686	5.1	1.3	2.8	1.20	5.8	1.30	19	1046	6.4	2.5	5.3	2.12	6.9	2.20	29	1086	8.1	141	7.2	62.6	3.05
			2023	11.21	12.16	25	良	125	88	10	178	3.3	1.05	10	555	4.0	1.0	3.4	1.19	4.8	1.30	18	953	5.8	1.7	3.0	2.08	6.9	2.20	31	1207	7.9	165	4.6	43.6	3.04
	適期播 小麦	チクゴイヅミ	2022	11.18	11.29	11	良	150	105	11	483	3.7	1.05	14	1120	5.2	1.2	2.5	1.18	5.9	1.30	22	1350	6.5	2.1	4.7	2.10	7.6	2.20	37	1459	8.6	229	5.5	62.2	3.03
			2021	11.19	12.01	12	良	134	94	11	608	4.4	1.05	12	935	5.5	1.2	5.0	1.20	6.5	1.31	19	1318	6.7	2.2	6.5	2.10	7.3	2.21	30	1451	7.8	199	4.0	34.5	3.03
			2020	11.18	11.26	8	良	146	100	12	619	4.7	1.05	13	1126	6.1	1.7	5.8	1.20	6.9	1.29	28	1231	7.5	3.1	23.4	2.10	8.3	2.19	51	1169	10.0	309	23.8	182.4	3.03
			2025	11.20	12.08	18	良	120	84	13	241	3.8	1.06	16	468	5.2	1.1	3.1	1.20	5.5	1.30	21	800	6.3	2.2	5.2	2.12	7.0	2.20	45	706	8.0	139	8.5	73.3	3.04
			平年	11.19	12.03	14	良	136	95	12	354	3.5	1.05	12	600	4.5	0.8	3.6	1.19	5.2	1.30	20	831	5.8	1.7	5.9	2.10	6.6	2.20	36	836	7.4	180	5.2	53.8	3.04
			平年差・比	+1	+5	+4	—	88	-11	108	68	+0.3	+1	133	78	+0.7	138	86	+1	+0.3	±0	105	96	+0.5	129	88	+2	+0.4	±0	125	84	+0.6	77	163	136	±0
			前年差・比	±0	+7	+7	—	91	-9	100	70	+0.4	-1	133	99	+0.9	183	111	±0	+0.5	±0	117	118	+0.7	169	141	±0	+0.8	±0	150	84	+1.1	123	266	317	-1
		はるみずき	2024	11.20	12.01	11	良	132	93	13	342	3.4	1.07	12	472	4.3	0.6	2.8	1.20	5.0	1.30	18	676	5.6	1.3	3.7	2.12	6.2	2.20	30	839	6.9	113	3.2	23.1	3.05
			2023	11.21	12.16	25	良	125	88	10	178	3.3	1.05	10	555	4.0	1.0	2.5	1.19	4.8	1.30	18	953	5.8	1.7	3.0	2.08	6.9	2.20	35	616	7.5	186	5.6	50.7	3.04
			2022	11.18	11.29	11	良	146	103	11	380	3.3	1.05	13	764	4.8	0.6	2.7	1.18	5.3	1.30	22	833	5.9	1.7	5.6	2.10	6.8	2.20	39	910	7.5	202	4.6	59.5	3.03
			2021	11.19	12.01	12	良	147	100	13	421	3.7	1.05	14	541	4.6	0.8	4.9	1.20	5.5	1.31	20	833	5.7	1.5	6.3	2.10	6.3	2.21	28	969	6.8	156	3.2	23.9	3.03
			2020	11.18	11.27	9	良	131	92	11	448	3.8	1.05	13	666	4.6	1.0	4.9	1.20	5.6	1.29	24	862	6.1	2.3	10.8	2.10	7.0	2.19	50	846	8.2	243	9.5	112.0	3.03
		はるみずき	2025	11.20	12.08	18	良	121	85	12	249	4.1	1.06	15	519	5.4	1.7	4.6	1.20	5.8	1.30	21	785	6.4	3.2	12.7	2.12	7.3	2.20	46	672	8.1	206	19.9	146.8	3.04

注1) 平年値は2020～2024年播の5か年の平均を表す(はるみずきを除く)。
注2) 差・比の値において符号があるものは差、ないものは比を表す。
注3) 端数処理の関係で、差・比の表示値は計算した値とずれる場合がある。

表-2 R7-8麦類作物判定試験調査結果(適期播)

地点	麦種	品種	播種年	3月13日		3月23日						主穂 葉数 (L)	出穂期 (月・日)	穂揃期 乾物重 (g/㎡)	穂重 (g/㎡)			成熟期 (月・日)	倒伏 出穂後 25日	程度 収穫期	穂長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/㎡)	一穂 粒数 (粒)	小穂 段数 (段)	千粒重 (g)	子実重 (kg/10a)	屑麦重 (%)	容積重 (g/L)	容積重 (kg/10a)	わら重 (kg/10a)	タンパク 含有率 (%)	検査 等級 ①	検査 等級 ②	
				葉齢	調査日	草丈	茎数	葉齢	乾物重	幼穂	幼穂				調査日	穂揃期	+15																		+30
				(L)	(月・日)	(cm)	(本/㎡)	(L)	(g/㎡)	(mm)	(mm)				(月・日)	(月・日)	(月・日)																		(月・日)
水田農業グループ(宇佐)	適期播 裸麦	ハルアカナ	2025	10.8	3.13	64	555	11.9	440	-	-	3.23	12.0	3.31	698	98	222	422	5.14	0.0	2.0	95	6.7	490	54	22	32.3	351	34.6	882	418	10.1	2.0	4.0	
			平年	9.6	3.13	57	639	11.2	400	42.2	313.8	3.23	11.8	4.01	614	99	225	537	5.14	0.5	2.5	82	6.0	458	56	23	31.6	388	24.6	852	368	8.2	1.2	3.0	
			平年差・比	+1.2	±0	112	87	+0.7	110	-	-	±0	+0.2	-2	114	99	99	79	±0	-0.5	-0.5	116	112	107	97	-1	102	90	+10.0	104	114	123	+0.8	+1.0	
			前年差・比	+1.8	±0	125	86	+1.1	122	-	-	-1	+0.6	-3	130	121	131	91	-1	±0.0	+0.5	127	118	124	98	-1	95	80	+24.4	102	129	107	+1.0	+1.0	
			2024	9.0	3.13	51	645	10.8	362	38.2	283.5	3.24	11.4	4.02	536	81	169	462	5.15	0.0	1.5	75	5.7	394	55	23	34.0	438	10.2	865	325	9.4	1.0	3.0	
			2023	9.2	3.13	44	589	10.2	321	24.6	190.4	3.22	11.4	4.04	500	82	204	447	5.14	0.0	3.5	82	6.0	356	61	24	29.8	194	42.1	816	269	9.2	1.0	2.0	
			2022	10.0	3.13	62	607	11.9	414	50.8	329.2	3.23	12.0	4.01	690	118	265	576	5.14	0.5	2.5	83	6.0	478	55	23	31.7	415	26.2	843	382	7.7	1.0	3.0	
			2021	9.1	3.14	53	862	10.9	386	32.0	276.5	3.23	11.8	4.05	793	116	272	617	5.19	2.0	4.0	82	5.8	584	52	22	30.6	367	32.0	862	415	8.5	2.0	4.0	
			2020	10.8	3.12	75	493	12.2	516	65.4	489.5	3.22	12.2	3.26	549	97	215	584	5.10	0.0	0.8	90	6.3	479	58	25	32.1	528	12.6	872	449	7.4	1.0	3.0	
	適期播 二条大麦	ニシノホシ	2025	10.6	3.13	65	853	11.7	508	-	-	3.23	11.8	3.31	659	85	185	791	5.15	3.0	3.5	93	7.0	754	24	27	43.9	326	34.3	735	454	9.4	2.0	4.0	
			平年	9.6	3.13	64	886	10.7	419	39.2	265.1	3.23	11.3	3.31	622	83	172	414	5.15	0.6	1.3	86	6.2	724	24	27	41.9	340	33.1	737	429	9.3	1.1	2.3	
			平年差・比	+1.0	±0	102	96	+1.0	121	-	-	±0	+0.5	±0	106	102	108	191	±0	+2.4	+2.2	108	113	104	101	+0	105	96	+1.2	100	106	101	+0.9	+1.7	
			前年差・比	+1.5	±0	114	93	+1.5	136	-	-	-1	+1.0	-3	111	108	125	221	-1	+3.0	+3.0	113	119	115	116	+1	98	80	+25.1	98	104	99	+1.0	+2.0	
			2024	9.1	3.13	57	921	10.2	373	45.2	303.5	3.24	10.8	4.02	594	79	148	358	5.16	0.0	0.5	82	5.9	655	21	26	45.0	408	9.2	752	437	9.5	1.0	2.0	
			2023	8.9	3.13	50	869	9.7	317	13.0	139.1	3.22	11.3	4.05	494	69	156	377	5.15	0.0	2.0	84	6.1	606	25	27	37.5	107	66.5	687	319	10.3	1.0	3.0	
			2022	9.9	3.13	72	854	11.5	487	52.2	324.7	3.23	11.3	4.02	773	114	193	521	5.15	1.3	2.0	90	6.2	731	27	29	41.8	330	39.7	754	438	8.8	1.0	2.0	
			2021	9.3	3.14	60	1069	10.7	390	46.2	293.1	3.23	11.5	4.03	718	89	203	441	5.19	1.5	2.0	87	6.3	908	25	27	42.5	367	32.9	755	480	9.2	1.5	3.5	
			2020	10.7	3.12	80	718	11.4	527	-	-	3.22	11.4	3.21	532	66	160	373	5.11	0.0	0.0	89	6.3	721	24	26	42.9	486	17.4	738	470	8.6	1.0	1.0	
	適期播 小麦	チクゴイブミ	2025	8.4	3.13	65	586	8.9	509	43.7	229.1	3.23	9.0	4.02	734	106	151	578	5.24	0.0	2.0	94	9.1	546	40	14	38.2	628	1.2	839	447	8.9	1.0	2.0	
			平年	8.2	3.13	66	651	8.9	395	33.3	230.3	3.23	9.4	4.04	696	103	164	356	5.27	0.1	2.0	88	8.2	532	41	16	39.2	555	1.0	824	528	9.3	1.4	3.1	
			平年差・比	+0.2	±0	98	90	±0.0	129	131	99	±0	-0.4	+2	105	103	92	162	-3	-0.1	±0.0	107	111	103	98	-2	97	113	+0.2	102	85	96	-0.4	-1.1	
			前年差・比	+0.9	±0	107	86	+0.4	148	196	114	-1	-0.4	-4	99	107	98	173	-4	±0.0	-0.3	111	110	118	114	-2	98	145	+0.4	101	80	92	-0.5	-1.5	
			2024	7.5	3.13	61	681	8.5	344	22.3	200.1	3.24	9.4	4.08	741	99	154	334	5.28	0.0	2.3	85	8.3	463	35	16	38.9	433	0.8	833	558	9.7	1.5	3.5	
			2023	8.1	3.13	57	546	8.6	309	21.1	164.3	3.22	9.2	4.04	590	91	143	350	5.25	0.5	2.3	82	9.1	485	47	16	36.0	485	2.2	802	383	9.6	1.0	3.0	
			2022	8.5	3.13	71	700	9.2	452	36.5	230.0	3.23	9.3	4.02	740	115	141	342	5.27	0.0	2.3	89	8.1	579	43	16	39.4	611	1.1	850	551	8.7	1.0	1.5	
			2021	7.9	3.14	60	705	8.7	372	18.6	165.6	3.23	9.4	4.09	851	113	202	390	5.29	0.0	1.5	93	7.4	565	40	16	41.6	624	0.3	818	621	9.5	2.5	4.5	
			2020	8.8	3.12	80	624	9.5	499	67.9	391.5	3.22	9.5	3.28	559	98	182	364	5.26	0.0	1.8	93	8.2	569	39	17	40.0	622	0.6	818	528	9.1	1.0	3.0	
		はるみずき	2025	8.5	3.13	64	597	8.9	527	-	-	3.23	9.0	3.27	-	-	167	470	5.24	0.0	2.0	86	10.0	499	42	15	38.1	555	2.5	825	419	12.6	2.0	4.0	



注1) 3月23日時点での出穂が確認された品種については、幼穂長・幼穂長の調査なし。

注2) 収量調査は水分12.5%換算。篩目は大麦2.5mm、裸麦・小麦は2.0mm。

注3) 倒伏は無(0)、微(1)、少(2)、中(3)、多(4)、甚(5)の6段階で評価。

注4) 検査等級①：1等、2等、規格外を1～3で示す。

検査等級②：1等上・中・下、2等、規格外を1～5で示す。









図3 葉齢の推移 (適期播)

表-3 R7-8麦類作物判定試験調査結果(晩播)



地点	麦種	品種	播種年	播種期 (月.日)	出芽期 (月.日)	出芽 日数 (日)	出芽 の良否	苗立数 (本/㎡)	出芽率 (%)	1月30日		2月10日		2月20日		3月3日				3月13日		3月23日									
										葉齡 (L)	調査日 (月.日)	草丈 (cm)	莖数 (本/㎡)	葉齡 (L)	調査日 (月.日)	葉齡 (L)	調査日 (月.日)	草丈 (cm)	莖数 (本/㎡)	葉齡 (L)	幼穂 (mm)	幼稈 (mm)	調査日 (月.日)	葉齡 (L)	調査日 (月.日)	草丈 (cm)	莖数 (本/㎡)	葉齡 (L)	幼穂 (mm)	幼稈 (mm)	調査日 (月.日)
水田農業グループ (宇佐)	晩播 二条大麦	ニシノホシ	2025	12.16	12.30	14	良	182	91	3.4	1.30	9	745	4.7	2.12	5.9	2.20	30	1212	7.4	3.8	28.2	3.04	8.1	3.13	50	962	9.2	25.0	187.9	3.23
			平年	12.15	1.10	26	良	189	94	2.5	1.30	9	498	3.6	2.10	4.8	2.20	19	1146	6.3	2.0	7.5	3.04	7.3	3.13	46	981	8.7	13.0	127.8	3.23
			平年差・比	+1	-11	-12	—	96	-3	+0.9	±0	100	150	+1.1	+2	+1.1	±0	158	106	+1.1	190	376	±0	+0.8	±0	109	98	+0.5	192	147	±0
			前年差・比	-1	-21	-20	—	97	-3	+1.5	±0	129	300	+2.1	±0	+2.7	±0	231	141	+2.3	292	762	-1	+1.9	±0	152	105	+1.7	556	678	-1
			2024	12.17	1.20	34	良	188	94	1.9	1.30	7	248	2.6	2.12	3.2	2.20	13	860	5.1	1.3	3.7	3.05	6.2	3.13	33	920	7.5	4.5	27.7	3.24
			2023	12.14	1.01	18	良	195	98	3.1	1.30	11	699	4.6	2.08	5.9	2.20	27	1320	7.2	2.7	12.6	3.04	8.2	3.13	39	941	8.9	11.5	106.8	3.22
			2022	12.15	1.11	27	良	190	95	2.3	1.30	9	581	3.7	2.10	5.4	2.20	19	1365	6.3	1.6	3.8	3.03	7.6	3.13	55	1012	9.2	11.2	131.4	3.23
			2021	12.15	1.02	18	良	187	93	2.8	1.31	8	623	3.8	2.10	5.0	2.21	14	1095	6.1	1.9	6.0	3.03	7.2	3.14	45	1183	8.6	13.2	118.5	3.23
			2020	12.15	1.17	33	良	185	92	—	—	10	338	3.4	2.10	4.7	2.19	23	1089	6.6	2.5	11.6	3.03	7.5	3.12	59	850	9.3	24.5	254.8	3.22
	晩播 小麦	チクゴイズミ	2025	12.16	12.30	14	良	182	91	2.8	1.30	9	438	3.9	2.12	4.8	2.20	25	862	6.4	2.4	9.1	3.04	6.9	3.13	48	675	8.0	13.3	129.8	3.23
			平年	12.15	1.11	27	良	176	87	2.3	1.30	10	337	3.3	2.10	4.3	2.20	19	668	5.4	1.6	7.6	3.04	6.4	3.13	45	689	7.4	8.9	80.6	3.23
			平年差・比	+1	-12	-13	—	103	+4	+0.5	±0	90	130	+0.6	+2	+0.5	±0	132	129	+1.0	150	120	±0	+0.5	±0	107	98	+0.6	149	161	±0
			前年差・比	-1	-21	-20	—	102	+2	+1.1	±0	113	205	+1.5	±0	+1.6	±0	192	148	+1.9	343	253	-1	+1.4	±0	150	99	+1.3	443	557	-1
			2024	12.17	1.20	34	良	179	89	1.7	1.30	8	214	2.4	2.12	3.2	2.20	13	584	4.5	0.7	3.6	3.05	5.5	3.13	32	685	6.7	3.0	23.3	3.24
			2023	12.14	1.02	19	良	185	92	2.8	1.30	12	556	4.4	2.08	5.3	2.20	27	742	6.3	2.8	15.4	3.04	7.0	3.13	44	622	7.7	12.4	104.4	3.22
			2022	12.15	1.11	27	良	183	91	2.3	1.30	10	386	3.3	2.10	4.4	2.20	19	712	5.4	1.4	4.0	3.03	6.6	3.13	54	685	7.7	9.7	90.5	3.23
			2021	12.15	1.03	19	良	177	88	2.5	1.31	8	331	3.4	2.10	4.3	2.21	12	751	5.0	1.1	4.7	3.03	6.3	3.14	38	805	7.4	5.1	50.8	3.23
			2020	12.15	1.18	34	中	154	77	—	—	10	196	3.1	2.10	4.2	2.19	23	550	5.6	2.0	10.2	3.03	6.5	3.12	58	650	7.5	14.3	134.1	3.22
		はるみずき	2025	12.16	12.30	14	良	172	86	3.2	1.30	9	443	4.1	2.12	5.2	2.20	26	745	6.5	2.8	15.6	3.04	7.0	3.13	52	626	7.9	20.7	145.7	3.23


注1) 平年値は2020～2024年播の5か年の平均を表す(はるみずきを除く)。
注2) 差・比の値において符号があるものは差、ないものは比を表す。
注3) 端数処理の関係で、差・比の表示値は計算した値とずれる場合がある。

表-4 R7-8麦類作柄判定試験調査結果(晩播)

地点	麦種	品種	播種年	4月3日							主稈 葉数 (L)	出穂期 (月・日)	穂揃期 乾物重 (g/㎡)	穂重(g/㎡)			成熟期 (月・日)	倒伏 程度		稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/㎡)	一穂 粒数 (粒)	小穂 段数 (段)	千粒重 (g)	子実重 (kg/10a)	屑麦重 歩合 (%)	容積重 (g/L)	わら重 (kg/10a)	タンパク 含有率 (%)	検査 等級 ①	検査 等級 ②
				草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	葉齢 (L)	乾物重 (g/㎡)	幼穂 (mm)	幼稈 (mm)	調査日 (月・日)				穂揃期	+15	+30		出穂後 25日	収穫期													
水田農業グループ (宇佐)	晩播 二条大麦	ニシノホシ	2025	71	896	10.5	523	-	-	4.03	10.5	4.09	695	112	239	703	5.19	3.0	3.0	93	6.6	754	23	26	43.4	305	43.6	755	368	8.9	2.0	4.0
			平年	63	768	10.4	382	51.1	330.7	4.03	10.8	4.10	548	86	189	435	5.22	1.0	1.6	84	6.6	549	23	26	44.9	314	27.6	726	339	9.2	1.2	2.8
			平年差・比	113	117	+0.1	137	-	-	±0	-0.3	-1	127	130	126	162	-3	+2.0	+1.4	111	100	137	99	-0	97	97	+16.0	104	109	1.2	+0.8	+1.2
			前年差・比	154	101	+1.3	208	-	-	-1	-0.2	-8	133	126	130	165	-9	+2.0	+2.0	109	94	151	99	-0	88	76	+34.9	102	116	2.0	+1.0	+2.0
			2024	46	884	9.2	251	26.8	156.0	4.04	10.7	4.17	521	89	184	426	5.28	1.0	1.0	85	7.0	499	23	26	49.5	400	8.7	741	316	9.1	1.0	2.0
			2023	62	696	11.1	366	55.6	352.1	4.02	11.1	4.08	494	74	176	348	5.17	0.0	1.5	77	5.8	535	22	25	39.8	195	40.5	703	279	9.5	1.0	3.0
			2022	68	779	10.8	460	59.9	358.2	4.03	10.9	4.10	648	97	216	480	5.23	2.0	2.3	87	6.9	601	22	25	43.8	292	31.8	731	330	9.2	1.0	3.0
	2021	65	826	10.0	378	49.5	332.4	4.04	10.5	4.12	598	96	232	485	5.23	2.0	3.0	89	6.3	634	24	26	42.9	202	50.5	732	386	8.8	1.0	2.0		
	2020	72	653	10.7	456	63.9	455.0	4.02	10.7	4.04	479	76	137	436	5.20	0.0	0.0	83	6.8	477	26	28	48.6	479	6.6	724	382	9.2	2.0	4.0		
	晩播 小麦	チクゴイズミ	2025	69	686	8.9	449	-	-	4.03	-	4.12	631	100	166	467	5.28	0.0	2.0	87	8.4	499	37	14	38.1	555	6.3	850	540	8.9	1.0	2.0
			平年	63	610	8.5	335	42.1	234.2	4.03	8.7	4.12	508	78	146	349	5.31	0.3	1.4	84	7.8	471	42	16	37.6	511	0.9	832	385	9.1	1.5	3.0
			平年差・比	110	112	+0.4	134	-	-	±0	-	±0	124	128	114	134	-3	-0.3	+0.6	104	108	106	88	-2	101	109	+5.4	102	140	-1.0	-0.5	-1.0
			前年差・比	144	105	+0.8	203	-	-	-1	-	-5	139	130	119	140	-7	-1.0	+0.5	106	120	114	100	±0	98	116	+5.3	102	165	-1.5	-0.5	-1.5
			2024	48	653	8.1	221	16.2	116.5	4.04	8.9	4.17	454	77	140	334	6.04	1.0	1.5	82	7.0	437	37	14	38.7	477	1.0	835	328	9.2	1.5	3.5
			2023	64	540	8.7	311	58.2	259.2	4.02	8.7	4.08	483	79	127	289	5.26	0.0	1.0	77	6.8	464	37	13	37.1	393	1.5	794	309	10.0	2.0	4.0
			2022	68	625	8.7	394	47.9	274.5	4.03	8.7	4.10	521	79	146	351	6.02	0.3	2.5	85	8.0	481	46	16	38.4	547	0.7	820	401	8.7	1.0	2.0
			2021	60	661	8.7	324	24.3	188.9	4.04	9.2	4.16	637	-	163	446	6.03	0.0	2.0	91	8.9	524	49	18	36.2	574	0.5	854	458	8.3	2.0	4.0
2020			73	570	8.2	424	63.9	331.9	4.02	8.2	4.07	446	78	155	324	5.29	0.0	0.0	84	8.4	450	41	17	37.7	566	0.9	857	430	9.2	1.0	1.5	
はるみずき		2025	71	579	8.8	447	65.6	280.3	4.03	8.9	4.07	305	89	204	467	5.28	0.0	1.5	83	9.5	516	38	14	34.5	571	1.1	850	439	4.0	2.0	4.0	

注1) 4月3日時点で出穂が確認された品種については、幼穂長・幼稈長の調査なし。
注2) 収量調査は水分12.5%換算。篩目は大麦2.5mm、小麦は2.0mm。
注3) 倒伏は無(0)、微(1)、少(2)、中(3)、多(4)、甚(5)の6段階で評価。
注4) 検査等級①：1等、2等、規格外を1～3で示す。
検査等級②：1等上・中・下、2等、規格外を1～5で示す。





令和7年播（令和8年産）冬作期間気象表（宇佐）

月	半旬	平均気温（℃）			最高気温（℃）			最低気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（h）		
		本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	比	本年	平年	比
11月	1	14.5	14.6	-0.1	20.0	20.6	-0.6	9.8	9.6	0.2	0.5	16.3	3	20.9	30.8	68
	2	15.6	14.5	1.1	21.1	20.2	0.9	9.7	9.6	0.1	1.5	7.5	20	34.1	26.8	127
	3	12.6	13.3	-0.7	18.9	18.7	0.2	7.2	8.5	-1.3	0.0	11.5	0	22.5	26.0	87
	4	11.5	11.6	-0.1	17.1	17.0	0.1	6.1	6.8	-0.7	0.0	11.1	0	26.0	24.4	107
	5	11.6	11.1	0.5	18.8	16.7	2.1	5.8	6.2	-0.4	3.5	7.1	49	34.9	25.7	136
	6	11.3	10.8	0.5	18.5	15.9	2.6	5.4	5.9	-0.5	3.5	10.0	35	32.8	20.4	161
12月	1	9.7	9.1	0.6	14.7	14.3	0.4	4.7	4.5	0.2	0.0	11.6	0	24.4	23.5	104
	2	8.6	7.8	0.8	16.0	13.0	3.0	1.8	3.3	-1.5	0.0	7.3	0	35.7	23.3	153
	3	7.9	7.9	0.0	13.0	12.9	0.1	1.5	3.4	-1.9	9.5	6.2	153	13.3	22.4	59
	4	10.2	6.8	3.4	17.4	11.6	5.8	3.6	2.3	1.3	3.5	6.1	57	30.2	20.9	144
	5	10.4	6.9	3.5	14.9	11.8	3.1	5.5	2.4	3.1	22.0	7.9	278	19.4	22.8	85
	6	5.7	5.9	-0.2	10.9	11.0	-0.1	1.1	1.5	-0.4	1.0	6.7	15	31.3	29.5	106
1月	1	5.1	5.6	-0.5	9.0	10.8	-1.8	1.6	0.9	0.7	0.0	2.8	0	18.6	25.0	74
	2	6.5	5.4	1.1	12.3	10.4	1.9	0.1	1.0	-0.9	0.0	6.7	0	37.0	24.3	152
	3	6.3	5.4	0.9	12.8	10.2	2.6	-0.4	1.3	-1.7	0.0	11.8	0	28.9	21.8	133
	4	8.2	5.5	2.7	15.5	10.6	4.9	2.2	1.2	1.0	0.0	8.1	0	33.8	22.7	149
	5	3.1	4.7	-1.6	7.0	9.3	-2.3	-0.4	0.5	-0.9	1.5	10.6	14	28.5	21.0	136
	6	4.0	4.9	-0.9	8.9	9.8	-0.9	-1.6	0.6	-2.2	0.0	9.9	0	40.6	29.8	136
2月	1	5.7	4.9	0.8	12.4	9.8	2.6	-0.2	0.5	-0.7	0.5	8.7	6	32.6	25.1	130
	2	4.2	5.2	-1.0	9.0	10.3	-1.3	-0.1	0.8	-0.9	0.5	6.7	7	20.7	27.0	77
	3	8.1	6.4	1.7	14.1	11.7	2.4	2.2	1.4	0.8	9.5	10.3	92	30.0	27.8	108
	4	8.0	5.9	2.1	13.2	10.9	2.3	2.0	1.5	0.5	0.0	11.3	0	38.0	26.8	142
	5	10.1	6.9	3.2	17.3	12.5	4.8	2.4	1.8	0.6	23.5	10.1	233	30.4	29.8	102
	6	11.5	7.6	3.9	14.3	12.8	1.5	8.5	2.4	6.1	27.0	13.1	206	10.4	17.5	59
3月	1	8.8	7.9	0.9	13.2	13.3	-0.1	4.0	2.9	1.1	35.0	15.2	230	26.4	27.3	97
	2	6.7	8.1	-1.4	11.5	13.3	-1.8	0.5	2.9	-2.4	7.5	12.1	62	32.2	30.8	105
	3	7.0	8.8	-1.8	13.1	14.9	-1.8	0.8	3.2	-2.4	0.0	12.1	0	48.5	32.4	150
	4	9.5	10.2	-0.7	16.0	16.1	-0.1	3.2	4.5	-1.3	13.0	14.7	88	35.9	30.2	119
	5	11.1	10.1	1.0	17.7	15.6	2.1	5.2	5.0	0.2	53.5	17.5	306	29.1	31.3	93
	6	12.8	11.3	1.5	20.4	17.3	3.1	6.0	6.0	0.0	7.5	16.3	46	41.3	39.8	104
4月	1	14.5	11.9	2.6	20.5	17.9	2.6	9.3	6.0	3.3	13.5	20.1	67	25.9	32.2	80
	2	14.4	13.1	1.3	21.0	19.3	1.7	6.8	7.5	-0.7	6.5	15.5	42	27.2	31.7	86
	3	16.7	13.7	3.0	21.0	19.7	1.3	13.1	8.3	4.8	29.5	15.1	195	15.2	32.0	48
	4	17.8	14.6	3.2	22.3	21.1	1.2	13.3	9.0	4.3	11.0	14.0	79	18.5	32.9	56
	5	15.6	15.3	0.3	21.3	21.1	0.2	9.6	9.9	-0.3	48.5	19.8	245	20.6	30.3	68
	6	16.9	15.9	1.0	21.6	22.3	-0.7	12.5	9.8	2.7	57.0	16.1	354	12.8	34.9	37
5月	1	17.6	17.5	0.1	24.3	23.7	0.6	11.4	11.9	-0.5	19.5	13.8	141	35.9	35.4	101
	2	19	17.8	1.2	28.2	23.7	4.5	9.8	12.6	-2.8	0.0	23.1	0	48.5	30.3	160
	3	21.4	18.0	3.4	30.4	24.1	6.3	12.7	12.3	0.4	0.0	25.2	0	53.5	32.3	166
	4	23.6	19.1	4.5	33.5	25.2	8.3	15.3	13.9	1.4	0.0	19.3	0	50.7	30.1	168
	5	23.9	19.6	4.3	30.7	25.8	4.9	18.7	14.0	4.7	9.0	14.6	62	29.8	32.8	91
	6	24	20.1	3.9	30.1	25.9	4.2	18.5	15.0	3.5	10.5	30.5	34	39.3	34.4	114
6月	1	23	20.7	2.3	27.9	26.5	1.4	20.4	15.9	4.5	85.0	21.9	388	12.6	29.8	42
	2	22.1	21.4	0.7	28.2	26.7	1.5	17.9	17.5	0.4	23.0	25.9	89	20.8	25.5	82
	3	23.7	22.2	1.5	31.1	27.0	4.1	16.6	18.2	-1.6	0.0	29.8	0	36.4	23.4	156
	4	24.7	23.0	1.7	29.7	28.1	1.6	21.1	19.1	2.0	80.0	57.7	139	8.4	24.8	34
	5	22.0	23.5	-1.5	25.0	27.9	-2.9	20.0	20.3	-0.3	264.0	62.8	420	3.5	18.5	19
	6	23.7	24.6	-0.9	29.7	29.3	0.4	19.2	21.4	-2.2	48.0	58.3	82	20.6	18.9	109

※平年値は11～12月は1995年～2024年の30年間、1～6月は1996年～2025年の30年間の平均値を示す。

令和7年播（令和8年産）冬作期間気象表（宇佐）

